

Link do produktu: <https://esilver.eu/velodes-soft-plyn-do-dezynfekcji-rak-5-l-p-753.html>

Velodes Soft płyn do dezynfekcji rąk 5 l

Cena brutto	231,31 zł
Cena netto	214,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	ML566-5
Kod producenta	Medi-line
Kod EAN	5907626633566

Opis produktu

Środek dezynfekujący i odkażający do rąk Velodes Soft 5L

Gotowy do użycia o przedłużonym działaniu, preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji rąk. Łagodny dla skóry, nie posiada barwników i substancji zapachowych, dzięki czemu nie powoduje podrażnień. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV, HBV, HCV) oraz wirusa Rota i Noro. Preparat zawiera lanolinę - zmiękczałą substancję ochronną, która zabezpiecza głębsze warstwy naskórka.

- opakowanie: 5 litrów (kanister)
- przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
- zastosowanie: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, domy opieki społecznej polecany do stosowania przez lekarzy, pielęgniarki, pacjentów
- bardzo szybkie działanie na wirusy otoczkowe
- szerokie spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków drożdży, gruźlicy i wirusów (ograniczone)
- czas działania: 30 sekund
- produkt przebadany dermatologicznie
- pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 6174/15
- produkt zawiera w składzie alkohol
- przeznaczony do profesjonalnego stosowania
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym

Spektrum	Normy wg EN 14885	Doza i czas
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 1275	30 sek.
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek.
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex)	EN 14476	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	45 sek.

Sposób użycia:

Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 90 sekund. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparat wykazuje przedłużone działanie dezynfekcji

chirurgicznej w czasie 3 godz. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Skład:

Substancja czynna w 100 g produktu: 60 g propan-2-ol, 0,5 g glukonian chlorheksydyny

Uwaga:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

